

**Единый государственный экзамен
по МАТЕМАТИКЕ
Профильный уровень**

Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–11 записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8

0	-	0	,	8															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Бланк

При выполнении заданий 12–18 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 \\ \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

Ответом к заданиям 1–11 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

Часть 1

- 1** Найдите корень уравнения


$$(x + 3)^9 = 512.$$

Ответ: _____.

- 2** В классе 16 учащихся, среди них два друга – Вадим и Сергей. Учащихся случайным образом разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Вадим и Сергей окажутся в одной группе.

Ответ: _____.

- 3** В ромбе $ABCD$ угол CDA равен 78° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.




Ответ: _____.

4 Найдите значение выражения

$$\frac{7 \sin 154^\circ}{\cos 77^\circ \cdot \cos 13^\circ}$$


Ответ: _____.

5 В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $BD_1 = 2AD$. Найдите угол между диагоналями DB_1 и CA_1 . Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____.

6 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 8)$. В какой точке отрезка $[-2; 3]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



Ответ: _____.


7 В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где $H_0 = 3$ м – начальный уровень воды, $a = \frac{1}{768}$ м/мин² и $b = -\frac{1}{8}$ м/мин – постоянные, t – время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ приведите в минутах.

Ответ: _____.

8 Расстояние между городами А и В равно 420 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через 1 час следом за ним со скоростью 80 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в В. Найдите расстояние от А до С. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $f(x) = kx + b$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -13,5$.



Ответ: _____.

- 10 При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле равна 0,3, а при каждом последующем – 0,4. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,9?

Ответ: _____.

- 11 Найдите точку максимума функции

$$y = \ln(x + 9) - 10x + 7.$$

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (12, 13 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 12 а) Решите уравнение

$$16^{\sin x} + 16^{\sin(x+\pi)} = \frac{17}{4}.$$

- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

- 13 В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона AB основания равна 16, а высота пирамиды равна 4. На рёбрах AB , CD и AS отмечены точки M , N и K соответственно, причём $AM = DN = 4$ и $AK = 3$.

- а) Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны.
б) Найдите расстояние от точки K до плоскости SBC .

- 14 Решите неравенство

$$\frac{15^x - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15}{-x^2 + 2x} \geq 0.$$

- 15 Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе, используется более совершенное оборудование.

В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $3t$ единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $4t$ единиц товара.

За каждый час работы (на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 500 рублей.

Григорий готов выделять 5 000 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?

16 Около треугольника ABC описана окружность. Прямая BO , где O – центр вписанной окружности, вторично пересекает описанную окружность в точке P .

- а) Докажите, что $OP = AP$.
б) Найдите расстояние от точки P до прямой AC , если $\angle ABC = 120^\circ$, а радиус описанной окружности равен 18.

17 Найдите все значения параметра a , для каждого из которых любой корень уравнения

$$4\sqrt[3]{3,5x - 2,5} + 3\log_2(3x - 1) + 2a = 0$$

принадлежит отрезку $[1; 3]$.

18 С натуральным числом проводят следующую операцию: между каждыми двумя его соседними цифрами записывают сумму этих цифр (например, из числа 1923 получается число 110911253).

- а) Приведите пример числа, из которого получается 2108124117.
б) Может ли из какого-нибудь числа получиться число 37494128?
в) Какое наибольшее число, кратное 11, может получиться из трёхзначного числа?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

**Система оценивания экзаменационной работы по математике
(профильный уровень)**

Каждое из заданий 1–11 считается выполненным верно, если экзаменуемый дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Верный ответ на каждое задание оценивается 1 баллом.

Номер задания	Правильный ответ
1	-1
2	0,2
3	51
4	14
5	60
6	3
7	48
8	240
9	-7
10	5
11	-8,9
12	а) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n; n \in Z$ б) $\frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}$
13	$2,4\sqrt{5}$
14	$(0; \log_5 3] \cup [\log_3 5; 2)$
15	500
16	27
17	$\left[-\frac{17}{2}; -\frac{7}{2}\right]$
18	а) 2847 б) нет в) 9 16 7 16 9

**Решения и критерии оценивания выполнения заданий
с развёрнутым ответом**

Количество баллов, выставленных за выполнение заданий 12–18, зависит от полноты решения и правильности ответа.

Общие требования к выполнению заданий с развёрнутым ответом: решение должно быть математически грамотным, полным, все возможные случаи должны быть рассмотрены. **Методы решения, формы его записи и формы записи ответа могут быть разными. За решение, в котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется максимальное количество баллов. Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов.**

Эксперты проверяют только математическое содержание представленного решения, а особенности записи не учитывают.

При выполнении задания могут использоваться без доказательства и ссылок любые математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.

12 а) Решите уравнение $16^{\sin x} + 16^{\sin(x+\pi)} = \frac{17}{4}$
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Источники:
 ЕГЭ (старый банк)
 ЕГЭ (новый банк)
 Основная школа 2017
 Ященко 2019 (36 вер)

а) $16^{\sin x} + 16^{-\sin x} = \frac{17}{4}$
 $16^{\sin x} + \frac{1}{16^{\sin x}} - \frac{17}{4} = 0 \quad | \cdot 16^{\sin x}$
 $(16^{\sin x})^2 - \frac{17}{4} \cdot 16^{\sin x} + 1 = 0$
 Пусть $16^{\sin x} = t$
 $t^2 - \frac{17}{4}t + 1 = 0 \quad | \cdot 4$
 $4t^2 - 17t + 4 = 0$
 $D = 289 - 64 = 225$
 $t = \frac{17 \pm 15}{8}$
 $t_1 = 4 \quad t_2 = \frac{1}{4}$
ОТВЕТ: а) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n; n \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}; \frac{19\pi}{6}$

б) Ответем корни с помощью окружности

Получим еще
 $x = \frac{2\pi}{6} + \frac{15}{6} = \frac{17\pi}{6}$
 $x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$
 $x = 3\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{17\pi}{6}$

13 В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона AB основания равна 16, а высота пирамиды равна 4. На ребрах AB, CD и AS отмечены точки M, N и K соответственно, причём $AM = DN = 4$ и $AK = 3$.

а) Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны.
 б) Найдите расстояние от точки K до плоскости SBC .

Источники:
 ЕГЭ (старый банк)
 ЕГЭ (новый банк)
 Демон 2021
 Ященко 2018
 Гурин 14 2019
 Основная школа 2016
 ПРИЗНАК ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ

а) ΔAOS
 $\alpha) AS = \sqrt{4^2 + (8\sqrt{2})^2} = 12$
 $\alpha) MN \parallel BC$
 т.к. $MN \parallel BC$ (т.к. $MN \parallel BC$ - т.к. $MN \parallel BC$)
 $\sqrt{F_{BCS}} = \frac{1}{3} \cdot 3BCS \cdot FH = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 16 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot FH = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2}$
 $FH = \frac{12}{5} = 2,4\sqrt{5}$

б) $\Delta AKM \sim \Delta ABS$ по 2 углам, т.к. $\angle KAM = \angle BAS$ и $\angle AKM = \angle ABS$
 $\frac{AK}{AS} = \frac{AM}{AB} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$
 $\Rightarrow KM \parallel SB$
 $\Rightarrow (MKN) \parallel (SBC)$

ОТВЕТ: $2,4\sqrt{5}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Получен обоснованный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 211220

14 Решите неравенство

$$15^x - 3^{x+1} - 5 \cdot 5^x + 15 \geq 0.$$

Источники:
 ЕГЭ (старый банк)
МЕТОД ЗАМЕНЫ
МНОЖИТЕЛЕЙ

Было	Стало
$\log_a f - \log_a g$	$(a-1)(f-g)$
$a^f - a^g$	$(a-1)(f-g)$
$\log_a f - \log_a g$	$(f-g)(f-a)$
$a^f - a^g$	$(f-g)(f-a)$

Handwritten solution:

$$\frac{15^x - 3 \cdot 3^x - 5 \cdot 5^x + 15}{x \cdot (2-x)} \geq 0$$

$$\frac{3^x \cdot (5^x - 3) - 5 \cdot (5^x - 3)}{x \cdot (2-x)} \geq 0$$

$$\frac{(5^x - 3) \cdot (3^x - 5)}{x \cdot (2-x)} \geq 0$$

$$\frac{(5^x - 5^{\log_5 3})(3^x - 3^{\log_5 5})}{x \cdot (2-x)} \geq 0$$

$$\frac{(5^x - 5^{\log_5 3})(3^x - 3^1) \cdot (x - \log_5 3)(x - \log_5 5)}{x \cdot (2-x)} \geq 0$$

Graphical solution on a number line with critical points at $0, \log_5 3, \log_5 5, 2$. Signs are: $+$ on $(0, \log_5 3)$, $-$ on $(\log_5 3, \log_5 5)$, $+$ on $(\log_5 5, 2)$, $-$ on $(2, \infty)$. Shaded regions are $(0, \log_5 3]$ and $[\log_5 5, 2)$.

ОТВЕТ: $(0; \log_5 3] \cup [\log_5 5; 2)$

15 Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производится абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $3t$ единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $4t$ единиц товара.

За каждый час работы (на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 500 рублей.

Григорий готов выделит 5 000 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?

Источники:
 ЕГЭ (старый банк)
 ЕГЭ (новый банк)
 Ященко 2018
 Шестаков 2017
 Дисконтим 2015

Handwritten solution:
 1) $(x^2 + y^2) \cdot 500 = 5\,000\,000$
 $x^2 + y^2 = 10000$
 $y^2 = 10000 - x^2$
 $y = \sqrt{10000 - x^2}$
 2) Надо найти макс зная. Выразим $3x + 4y$
 $f(x) = 3x + 4 \cdot \frac{\sqrt{10000 - x^2}}{2}$
 $f'(x) = 3 + 4 \cdot \frac{1 \cdot (-2x)}{2\sqrt{10000 - x^2}} = 0$
 $\frac{3}{4} - \frac{4x}{\sqrt{10000 - x^2}} = 0$
 $3\sqrt{10000 - x^2} = 4x \quad | \wedge 2$
 $9 \cdot (10000 - x^2) = 16x^2$
 $9 \cdot 10000 = 25x^2$
 $x^2 = \frac{9 \cdot 10000}{25}$
 $x = \frac{3 \cdot 100}{5} = 60$
 $f(60) = f_{\max} = 3 \cdot 60 + 4 \cdot \sqrt{10000 - 3600} = 500$

ОТВЕТ: 500



Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением / включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 211220

16 Около треугольника ABC описана окружность. Прямая BO , где O — центр вписанной окружности, вторично пересекает описанную окружность в точке P .

- а) Докажите, что $OP = AP$.
 б) Найдите расстояние от точки P до прямой AC , если $\angle ABC = 120^\circ$, а радиус описанной окружности равен 18.



ОТВЕТ: 27

Источники:
 Основная волна 2019

17 Найдите все значения параметра a , для каждого из которых любой корень уравнения

$$4\sqrt{3,5x-2,5} + 3\log_2(3x-1) + 2a = 0$$

принадлежит отрезку $[1; 3]$.

Решение: $3x-1 > 0$
 $3x > 1$
 $x > \frac{1}{3}$

Пусть $f(x) = 4\sqrt{3,5x-2,5} = 4\sqrt{3,5x-2,5}$
 $f'(x) = \frac{4}{2} \cdot \frac{3,5}{\sqrt{3,5x-2,5}} = \frac{2 \cdot 3,5}{\sqrt{3,5x-2,5}} > 0$

$f(x)$ — возр. функция
 Пусть $g(x) = 3\log_2(3x-1)$
 $g'(x) = 3 \cdot \frac{1}{(3x-1) \cdot \ln 2} > 0$

$g(x)$ — возр. функция

ОТВЕТ: $[-8,5; -3,5]$

Источники:

Ященко 2019
 Ященко 2018
 Логические задачи (Ремесло) 2014

В левой части уравнения корень суммы двух возр. функций. Рассмотрим сумму двух возр. функций при $x > \frac{1}{3}$.

$f(x) = 4\sqrt{3,5x-2,5}$
 $f(1) = 4 + 3 = 7$
 $f(3) = 8 + 9 = 17$

$7 \leq -2a \leq 17$
 $-\frac{17}{2} \leq a \leq -\frac{7}{2}$

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Получен обоснованный ответ в пункте b ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта a , и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , ИЛИ при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого конечным числом точек	3
С помощью верного рассуждения получены все граничные точки искомого множества значений a	2
Верно получена хотя бы одна граничная точка искомого множества значений a	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

