

## Задания пригласительного школьного этапа ВсОШ

по математике для 10 класса

2025-2026 учебный год

Максимальное количество баллов за задачу — 7

Максимальное количество баллов за работу — 56

**Задача 1.1.** Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 20$  и  $a_1 \cdot a_3 = 40$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Вариант 1.2.* Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 26$  и  $a_1 \cdot a_3 = 39$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Вариант 1.3.* Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 22$  и  $a_1 \cdot a_3 = 33$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Вариант 1.4.* Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 26$  и  $a_1 \cdot a_3 = 91$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

**Задача 2.1.** По кругу лежат 900 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Вариант 2.2.* По кругу лежат 1200 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Вариант 2.3.* По кругу лежат 1500 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Вариант 2.4.* По кругу лежат 1800 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

**Задача 3.1.** Дан выпуклый четырехугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырехугольника равна 120. Найдите периметр четырехугольника.

*Вариант 3.2.* Дан выпуклый четырехугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырехугольника равна 270. Найдите периметр четырехугольника.

*Вариант 3.3.* Дан выпуклый четырехугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырехугольника равна 480. Найдите периметр четырехугольника.

*Вариант 3.4.* Дан выпуклый четырехугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырехугольника равна 750. Найдите периметр четырехугольника.

**Задача 4.1.** Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 1: К условию задачи 4.1

*Вариант 4.2.* Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 3: К условию задачи 4.2

**Вариант 4.3.** Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 5: К условию задачи 4.3

**Вариант 4.4.** Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 7: К условию задачи 4.4

**Задача 5.1.** У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 30, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

**Вариант 5.2.** У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 33, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

**Вариант 5.3.** У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 36, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

**Вариант 5.4.** У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 39, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

**Задача 6.1.** Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{3} + \sin \frac{\pi x}{7} = 2.$$

**Вариант 6.2.** Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{3} + \sin \frac{\pi x}{11} = 2.$$

**Вариант 6.3.** Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{5} + \sin \frac{\pi x}{9} = 2.$$

**Вариант 6.4.** Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{5} + \sin \frac{\pi x}{17} = 2.$$

**Задача 7.1.** У Зевса есть карточки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида  $O^{L^{I^M\Pi}}$ . Какова вероятность, что полученное число будет заканчиваться на 1?

Обратите внимание, что возведение в степень выполняется сверху вниз, т. е. сначала  $M$  возводится в степень  $\Pi$ , затем  $I$  возводится в результат предыдущего действия и т.д.

**Вариант 7.2.** У Зевса есть карточки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида  $O^{L^{I^M\Pi}}$ . Какова вероятность, что полученное число не будет заканчиваться на 1?

Обратите внимание, что возведение в степень выполняется сверху вниз, т. е. сначала  $M$  возводится в степень  $\Pi$ , затем  $I$  возводится в результат предыдущего действия и т.д.

**Задача 8.1.** Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (800; 600)$  и  $E = (810; 610)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Вариант 8.2.* Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (400; 300)$  и  $E = (410; 310)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Вариант 8.3.* Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (600; 300)$  и  $E = (610; 310)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Вариант 8.4.* Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (900; 400)$  и  $E = (910; 410)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

**Разбор заданий пригласительного этапа ВсОШ  
по математике для 10 класса**

**2025-2026 учебный год**

**Максимальное количество баллов за задачу — 7**

**Максимальное количество баллов за работу — 56**

**Задача 1.1.** Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 20$  и  $a_1 \cdot a_3 = 40$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Ответ:* 34

*Решение.* Заметим, что по свойству арифметической прогрессии  $a_3 = \frac{a_2+a_4}{2} = 10$ . Из второго равенства будет следовать, что  $a_1 = \frac{40}{a_3} = 4$ .

Пусть  $d$  является разностью этой прогрессии. Тогда  $10 = a_3 = a_1 + 2d = 4 + 2d$ , откуда  $d = 3$ .

Наконец,  $a_{11} = a_1 + 10d = 4 + 10 \cdot 3 = 34$ .

**Вариант 1.2.** Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 26$  и  $a_1 \cdot a_3 = 39$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Ответ:* 53

**Вариант 1.3.** Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 22$  и  $a_1 \cdot a_3 = 33$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Ответ:* 43

**Вариант 1.4.** Арифметическая прогрессия  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  такова, что  $a_2 + a_4 = 26$  и  $a_1 \cdot a_3 = 91$ . Найдите значение  $a_{11}$ .

*Ответ:* 37

**Задача 2.1.** По кругу лежат 900 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Ответ:* 450.

*Решение.* Предположим, что в какой-то четвёрке соседних шаров есть два красных шара. Если они лежат рядом, то рассмотрим такую четвёрку, где они лежат на втором и третьем месте. Где-то в этой четвёрке должен быть зелёный шар, но тогда он окажется рядом с красным, противоречие. Если же красные шары не лежат рядом, то опять-таки зелёный шар в этой четвёрке находится рядом с каким-то красным, противоречие. Значит, в каждой четвёрке не более одного красного шара.

Аналогично можно понять, что в каждой четвёрке не более одного зелёного шара. Поскольку в каждой четвёрке хотя бы по одному шару каждого цвета, синих шаров может

быть только ровно 2. Тогда все 900 шаров можно разбить на 225 четвёрок, и поскольку в каждой из них ровно 2 синих шара, всего синих шаров 450.

При этом 450 синих шаров может быть, если шары чередуются так: синий, красный, синий, зелёный, синий, красный, синий, зелёный, ...

*Вариант 2.2.* По кругу лежат 1200 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Ответ:* 600.

*Вариант 2.3.* По кругу лежат 1500 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Ответ:* 750.

*Вариант 2.4.* По кругу лежат 1800 шаров. Каждый шар окрашен в один из трёх цветов — синий, красный или зелёный. Известно, что среди любых четырёх подряд идущих шаров есть шары всех трёх цветов. Кроме того, никакой красный шар не соседствует с зелёным. Сколько синих шаров может быть? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Ответ:* 900.

**Задача 3.1.** Дан выпуклый четырёхугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырёхугольника равна 120. Найдите периметр четырёхугольника.

*Ответ:* 48

*Решение.* Пусть длины отрезков  $AB, BC, CD$  равны  $7x, 6x, 2x$  соответственно. Записав теоремы Пифагора для треугольников  $ABC$  и  $ADC$ , получим равенство

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = AD^2 + DC^2$$

$$49x^2 + 36x^2 = AD^2 + 4x^2$$

$$AD^2 = (49 + 36 - 4)x^2 = 81x^2$$

$$AD = 9x$$

Выразив площадь четырёхугольника  $ABCD$  через сумму площадей треугольников  $ABC$  и  $ADC$ , получим

$$120 = \frac{7x \cdot 6x}{2} + \frac{9x \cdot 2x}{2} = 21x^2 + 9x^2 = 30x^2,$$

откуда  $x = 2$ .

Наконец, периметр  $ABCD$  равен  $7x + 6x + 9x + 2x = 24x = 48$ .

*Вариант 3.2.* Дан выпуклый четырёхугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырёхугольника равна 270. Найдите периметр четырёхугольника.

*Ответ:* 72

*Вариант 3.3.* Дан выпуклый четырёхугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырёхугольника равна 480. Найдите периметр четырёхугольника.

*Ответ:* 96

*Вариант 3.4.* Дан выпуклый четырёхугольник  $ABCD$ , в котором  $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ . Оказалось, что  $AB : BC : CD = 7 : 6 : 2$ , а площадь четырёхугольника равна 750. Найдите периметр четырёхугольника.

*Ответ:* 120

**Задача 4.1.** Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 1: К условию задачи 4.1

Ответ:





Рис. 2: К решению задачи 4.1



*Решение.* Больше 8 клеток отметить не получится. Для доказательства этого разобьём белые клетки доски на 8 частей, в каждой из которых можно отметить не более одной белой клетки.

Можно доказать, что пример единственный.

*Вариант 4.2.* Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.

*Вариант 4.3.* Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 3: К условию задачи 4.2

*Ответ:*




Рис. 4: К решению задачи 4.2




Рис. 5: К условию задачи 4.3

*Ответ:*




Рис. 6: К решению задачи 4.3

*Вариант 4.4.* Отметьте на рисунке максимально возможное количество белых клеток так, чтобы они не касались друг друга по стороне или углу.




Рис. 7: К условию задачи 4.4

*Ответ:*




Рис. 8: К решению задачи 4.4

**Задача 5.1.** У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 30, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

*Ответ:* 88.

*Решение.* При каждом шаге в одной из кучек количество монет уменьшается на 2, а в каждой из других — увеличивается на 1. Это означает, что разность числа монет между кучками либо не меняется, либо изменяется на 3. Поэтому остатки от деления на 3 количества монет в кучках всегда равны друг другу.

Можно понять, что в каждой кучке всегда остаётся хотя бы одна монета, т.к. если из кучки забирали монеты, то в ней оставалось нечётное количество монет, т.е. не 0. Может ли в двух кучках остаться ровно по 1 монете? Нет, т.к. на предыдущем ходу в какую-то из кучек требовалось положить монету, т.е. в ней должно было быть 0 монет, что невозможно.

Могло ли в двух кучках остаться ровно по 2 монеты? Если так, то на предыдущем ходу монеты забирались из третьей кучки, но тогда в этих кучках было по 1 монете, что невоз-можно, как мы уже доказали.

В одной кучке 1 монета, а в другой 2 быть не могло, т.к. 1 и 2 дают разные остатки при делении на 3. Значит, в двух кучках суммарно не менее 5 монет, т.е. в третьей не более  $30 + 18 + 45 - 5 = 88$  монет.

Теперь покажем, как собрать в одной кучке 88 монет. Для этого сначала из кучки из 45 монет переложим по одной в две другие, в них станет 31 и 19. Далее будем следить толь-ко за этими двумя кучками, оставшиеся монеты всегда в третьей. Если сначала дважды брать из большей из них, а потом дважды из меньшей, то в каждой из этих кучек количе-ство монет уменьшится на 2 и можно будет продолжать эту операцию. Так можно делать, пока во второй кучке не останется 1 монета, а в первой тогда будет 13 монет. Далее 6 раз возьмём из неё, будут кучки по 1 и по 7, а потом 3 раза из второй кучки, будут кучки по 4 и по 1. В них суммарно 5 монет, поэтому в третьей кучке 88 монет.

*Вариант 5.2.* У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 33, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

*Ответ:* 91.

*Вариант 5.3.* У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 36, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

*Ответ:* 94 монет.

*Вариант 5.4.* У Коли есть три стопки с монетами: в одной — 39, в другой — 18, в третьей — 45 монет. Он перекладывает монеты между кучками. На очередном шаге он должен выбрать стопку с нечётным количеством монет, забрать оттуда две монеты и положить по одной в две другие кучки. Какое наибольшее количество монет Коля сможет собрать в одной стопке?

*Ответ:* 97 монет.

**Задача 6.1.** Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{3} + \sin \frac{\pi x}{7} = 2.$$

*Ответ:* 31,5

*Решение.* Поскольку  $\sin \frac{\pi x}{3} \leq 1$  и  $\sin \frac{\pi x}{7} \leq 1$ , их сумма будет равна 2 в том и только том случае, когда

$$\begin{cases} \sin \frac{\pi x}{3} = 1 \\ \sin \frac{\pi x}{7} = 1 \end{cases}$$

Это возможно только при целых  $n$  и  $m$ , что

$$\begin{cases} \frac{\pi x}{3} = \pi/2 + 2\pi n \\ \frac{\pi x}{7} = \pi/2 + 2\pi m \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3/2 + 6n \\ x = 7/2 + 14m \end{cases}$$

Из второго уравнения следует, что  $m$  должно быть неотрицательным. Для  $m = 0$  и  $m = 1$  получается, что  $n$  будет нецелым. Для  $m = 2$  получим что  $n = 5$ . Таким образом, минимальное положительное такое  $x$  равно 31.5.

*Вариант 6.2.* Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{3} + \sin \frac{\pi x}{11} = 2.$$

*Ответ:* 49,5

*Вариант 6.3.* Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{5} + \sin \frac{\pi x}{9} = 2.$$

*Ответ:* 22,5

**Вариант 6.4.** Найдите наименьшее положительное решение уравнения

$$\sin \frac{\pi x}{5} + \sin \frac{\pi x}{17} = 2.$$

**Ответ:** 42,5

**Задача 7.1.** У Зевса есть карточки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида  $O^{L^{I^{M^P}}}$ . Какова вероятность, что полученное число будет заканчиваться на 1?

Обратите внимание, что возведение в степень выполняется сверху вниз, т. е. сначала  $M$  возводится в степень  $P$ , затем  $I$  возводится в результат предыдущего действия и т.д.

**Ответ:**  $\frac{17}{60}$

**Решение.** Если на место  $O$  поставить цифры 2 или 4, то число будет чётным и не будет заканчиваться на 1. Если поставить 5, то оно будет заканчиваться на 5. Если поставить 1, то любая комбинация оставшихся нам подойдёт, вероятность этого равна  $\frac{1}{5}$ , т.к. на месте  $O$  все цифры равновероятны.

Если же на месте  $O$  будет цифра 3, то число будет заканчиваться на 1 только в том случае, если степень, в которую возводится 3, делится на 4. Действительно, последние цифры степеней тройки зацикливаются с периодом 4:  $3^0 = 1$ ,  $3^1 = 3$ ,  $3^2 = 9$ ,  $3^3 = 27$ ,  $3^4 = 81$ , ...

Посмотрим, когда  $L^{I^{M^P}}$  будет делиться на 4. Для этого  $L$  должно быть чётным. При этом если  $L = 2$ , то  $I$  не должно быть равно 1, т.к. иначе  $L^{I^{M^P}} = 2$ .

Посчитаем вероятности. Вероятность того, что  $O = 3$  и  $L = 4$  равна  $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$ . Вероятность того что  $O = 3$  и  $L = 2$  тоже равна  $\frac{1}{20}$ . При этом вероятность того что  $O = 3$ ,  $L = 2$  и  $I = 1$  равна  $\frac{1}{20} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{60}$ .

В итоге получаем  $\frac{1}{5} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{12+3+3-1}{60} = \frac{17}{60}$ .

**Вариант 7.2.** У Зевса есть карточки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида  $O^{L^{I^{M^P}}}$ . Какова вероятность, что полученное число не будет заканчиваться на 1?

Обратите внимание, что возведение в степень выполняется сверху вниз, т. е. сначала  $M$  возводится в степень  $P$ , затем  $I$  возводится в результат предыдущего действия и т.д.

**Ответ:**  $\frac{43}{60}$

**Задача 8.1.** Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (800; 600)$  и  $E = (810; 610)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Ответ:* 800

*Решение.* Заметим, что геометрическим местом таких точек  $A$ , что площадь треугольника  $ABC$  постоянна, являются две прямые, параллельные  $BC$  и симметричные относительно неё. Аналогично, геометрическим местом таких точек  $A$ , что площадь треугольника  $ADE$  постоянна, являются две прямые, параллельные  $DE$  и симметричные относительно неё.




Рис. 9: К решению задачи 8.1

Заметим, что тогда точка  $A$  может совпадать с одной из четырёх точек пересечения этих двух пар параллельных прямых, которые образуют параллелограмм. Несложно также заметить, что точка пересечения прямых  $BC$  и  $DE$  является центром этого параллелограмма. Точка  $M$  пересечения прямых  $BC$  и  $DE$  имеет координаты  $(200; 0)$ .

Абсцисса центра параллелограмма является средним арифметическим абсцисс его вершин. Таким образом, сумма абсцисс параллелограмма равна абсциссе точки  $M$ , умноженной на 4, то есть  $200 \cdot 4 = 800$ .

**Вариант 8.2.** Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (400; 300)$  и  $E = (410; 310)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Ответ:* 400

**Вариант 8.3.** Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (600; 300)$  и  $E = (610; 310)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Ответ:* 1200

*Вариант 8.4.* Треугольники  $ABC$  и  $ADE$  расположены на координатной плоскости так, что  $B = (0; 0)$ ,  $C = (123; 0)$ ,  $D = (900; 400)$  и  $E = (910; 410)$ , а их площади равны 1234 и 5678 соответственно. Чему равна сумма всех возможных абсцисс точки  $A$ ?

Напомним, что *абсциссой* точки называется её координата по оси  $Ox$ .

*Ответ:* 2000