

**Задания пригласительного школьного этапа ВсОШ**

по математике для 9 класса

2025-2026 учебный год

Максимальное количество баллов за задачу — 7

Максимальное количество баллов за работу — 56

*Задача 1.1.* В школьной библиотеке 89 детских журналов, из которых 15 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

*Вариант 1.2.* В школьной библиотеке 93 детских журнала, из которых 19 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

*Вариант 1.3.* В школьной библиотеке 85 детских журналов, из которых 11 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

*Вариант 1.4.* В школьной библиотеке 97 детских журналов, из которых 23 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

**Задача 2.1.** Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 1: К условию задачи 2.1

**Вариант 2.2.** Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 3: К условию задачи 2.2

**Вариант 2.3.** Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 5: К условию задачи 2.3

**Вариант 2.4.** Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 7: К условию задачи 2.4

**Задача 3.1.** В первый день лета Петя прочитал одну страницу 227-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочитать 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Вариант 3.2.* В первый день лета Петя прочитал одну страницу 245-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочитать 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Вариант 3.3.* В первый день лета Петя прочитал одну страницу 267-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочитать 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

*Вариант 3.4.* В первый день лета Петя прочитал одну страницу 237-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочитать 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

**Задача 4.1.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMU$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 32^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.




Рис. 9: К задаче 4.1

**Вариант 4.2.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMU$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 37^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.




Рис. 11: К задаче 4.2

**Вариант 4.3.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMU$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 43^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.




Рис. 12: К задаче 4.3

**Вариант 4.4.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMU$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 46^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.

**Задача 5.1.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{12a-11b}{a+b}$  является целым числом?

**Вариант 5.2.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{5a-14b}{a+b}$  является целым числом?

**Вариант 5.3.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{6a-23b}{a+b}$  является целым числом?

**Вариант 5.4.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{9a-22b}{a+b}$  является целым числом?

**Задача 6.1.** В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, шесть учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	2 июля	6

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

*Вариант 6.2.* В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, семь учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	4 января	6
Захар	2 июля	7

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

*Вариант 6.3.* В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, восемь учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	4 января	6
Захар	5 декабря	7
Игорь	2 июля	8

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

*Вариант 6.4.* В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, девять учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	4 января	6
Захар	5 декабря	7
Игорь	5 октября	8
Кирилл	2 июля	9

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

**Задача 7.1.** Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P$ ,  $Q$ ,  $X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 2$ ,  $QC = 5$ ,  $AX = 1$ .




Рис. 14: К задаче 7.1

**Вариант 7.2.** Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P$ ,  $Q$ ,  $X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 3$ ,  $QC = 7$ ,  $AX = 2$ .




Рис. 16: К задаче 7.2

**Вариант 7.3.** Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P$ ,  $Q$ ,  $X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 4$ ,  $QC = 7$ ,  $AX = 2$ .




Рис. 17: К задаче 7.3

**Вариант 7.4.** Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P, Q, X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 5, QC = 9, AX = 2$ .




Рис. 18: К задаче 7.4

**Задача 8.1.** Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 600000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

**Вариант 8.2.** Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 700000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

**Вариант 8.3.** Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 800000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

**Вариант 8.4.** Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 900000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

# Разбор заданий пригласительного этапа ВсОШ

по математике для 9 класса

2025-2026 учебный год

Максимальное количество баллов за задачу — 7

Максимальное количество баллов за работу — 56

*Задача 1.1.* В школьной библиотеке 89 детских журналов, из которых 15 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

Ответ: 22

Решение. Обозначим через  $x$  количество журналов, которые нужно заказать. Тогда получим, что  $15 + x = \frac{1}{3}(89 + x)$ , что преобразуется в уравнение  $45 + 3x = 89 + x$ , у которого есть единственное решение  $x = \frac{89-45}{2} = 22$ .

*Вариант 1.2.* В школьной библиотеке 93 детских журнала, из которых 19 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

Ответ: 18

*Вариант 1.3.* В школьной библиотеке 85 детских журналов, из которых 11 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

Ответ: 26

*Вариант 1.4.* В школьной библиотеке 97 детских журналов, из которых 23 — с кроссвордами. Сколько ещё журналов с кроссвордами нужно заказать, чтобы их вклад составил ровно треть от общего числа?

Ответ: 14

*Задача 2.1.* Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 1: К условию задачи 2.1




Рис. 2: К решению задачи 2.1

*Ответ:*

Можно доказать, что этот пример единственный.

*Вариант 2.2.* Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 3: К условию задачи 2.2

*Ответ:*




Рис. 4: К решению задачи 2.2

*Вариант 2.3.* Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 5: К условию задачи 2.3

Ответ:




Рис. 6: К решению задачи 2.3

*Вариант 2.4.* Отметьте 5 клеток данной таблицы  $5 \times 5$  так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой обведенной области была ровно одна отмеченная клетка и чтобы эти клетки не касались друг друга стороной или углом.




Рис. 7: К условию задачи 2.4

Ответ:

**Задача 3.1.** В первый день лета Петя прочитал одну страницу 227-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочитать 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.




Рис. 8: К решению задачи 2.4

Ответ: 13 или 16.

Решение. Пусть Петя непрерывно читал  $x$  дней, потом у него был день рождения, а потом он снова непрерывно читал  $29 - x$  дней. За первые дни он прочитал  $1 + 2 + \dots + x = \frac{x(x+1)}{2}$  страниц. За последующие дни он прочитал  $1 + 2 + \dots + (29 - x) = \frac{(29-x)(30-x)}{2}$  страниц.

Получаем уравнение

$$\frac{x(x+1)}{2} + \frac{(29-x)(30-x)}{2} = 227$$

$$x(x+1) + (29-x)(30-x) = 454$$

$$2x^2 + (1 - 29 - 30)x + 29 \cdot 30 = 454$$

$$2x^2 - 58x + 416 = 0$$

$$x^2 - 29x + 208 = 0$$

$$(x - 13)(x - 16) = 0$$

Значит есть два варианта:  $x = 13$  или  $x = 16$ .

В конце месяца Петя прочитал  $29 - x$  страниц, то есть 16 или 13. □

*Вариант 3.2.* В первый день лета Петя прочитал одну страницу 245-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочесть 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 10 или 19.

*Вариант 3.3.* В первый день лета Петя прочитал одну страницу 267-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочесть 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 8 или 21.

**Вариант 3.4.** В первый день лета Петя прочитал одну страницу 237-страничной книги. Каждый следующий день он читал на одну страницу больше, чем в предыдущий, кроме своего дня рождения, когда ему было некогда и он ничего не прочел. 30 июня он дочитал книгу. Сколько страниц он мог прочесть 30 июня? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 11 или 18.

**Задача 4.1.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BYM$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 32^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.




Рис. 9: К задаче 4.1

Ответ: 30, 62, 88

**Решение.** Заметим, что поскольку  $M$  является серединой гипотенузы прямоугольного треугольника  $ABC$ , то  $AM = MB = MC$ , откуда получается, что точки  $A, B, C, X$  и  $Y$  лежат на окружности с центром  $M$  и радиусом  $MC$ .

Поскольку треугольник  $CXY$  вписан в эту окружность, то по теореме о вписанном угле  $\angle CYX = \frac{\widehat{CX}}{2} = \frac{\widehat{CA} + \widehat{AX}}{2} = \angle ABC + 30^\circ = 62^\circ$ . Аналогично получаем, что  $\angle CXY = \angle CAB + 30^\circ = 88^\circ$ .

И, наконец, по сумме углов треугольник  $CXY$  получаем, что  $\angle XCY = 30^\circ$ . □




Рис. 10: К решению задачи 4.1

*Вариант 4.2.* На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMY$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 37^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.




Рис. 11: К задаче 4.2

Ответ: 30, 67, 83

**Вариант 4.3.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMU$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 43^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.




Рис. 12: К задаче 4.3

Ответ: 30, 73, 77

**Вариант 4.4.** На гипотенузе  $AB$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили середину  $M$ . Точки  $X$  и  $Y$  расположены на плоскости так, как на рисунке, причём треугольники  $AMX$  и  $BMU$  равносторонние. Найдите углы треугольника  $CXY$ , если  $\angle ABC = 46^\circ$ . Ответ выразите в градусах. Порядок ответов не важен.

Ответ: 30, 76, 74

**Задача 5.1.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{12a-11b}{a+b}$  является целым числом?

Ответ: 22

**Решение.** Заметим, что  $\frac{12a-11b}{a+b} = 12 - \frac{23b}{a+b}$ , что означает, что  $23b$  делится на  $a+b$ . Поскольку  $\text{НОД}(a, b) = 1$ ,  $23$  делится на  $a+b$ . Числа  $a$  и  $b$  натуральные, а число  $23$  является простым, поэтому это возможно только в случае, когда  $a+b = 23$ . Таких пар  $(a, b)$  ровно 22, все они имеют вид  $(x, 23-x)$  для натурального  $x$  от 1 до 22.  $\square$




Рис. 13: К задаче 4.4

**Вариант 5.2.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{5a-14b}{a+b}$  является целым числом?

**Ответ:** 18

**Вариант 5.3.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{6a-23b}{a+b}$  является целым числом?

**Ответ:** 28

**Вариант 5.4.** Сколько существует таких пар натуральных чисел  $(a, b)$ , что  $\text{НОД}(a, b) = 1$  и  $\frac{9a-22b}{a+b}$  является целым числом?

**Ответ:** 30

**Задача 6.1.** В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, шесть учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	2 июля	6

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

Ответ:  $C_5^2 = 10$

*Решение.* Можно понять, что Евгений должен прийти последним, т.к. иначе он не попадёт на стул 6. Среди остальных людей Богдан должен прийти позже Андрея, а Глеб и Дмитрий – после Вадима, причём Дмитрий – после Глеба.

Получается, что если выбрать пару мест для Андрея и Богдана, то места для оставшихся троих (Вадима, Глеба и Дмитрия) будут определены однозначно. Значит, количество различных вариантов равно количеству способов выбрать пару мест для Андрея и Богдана среди пятерых, т.е.  $C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ .

□

*Вариант 6.2.* В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, семь учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	4 января	6
Захар	2 июля	7

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

Ответ:  $C_6^2 = 15$

*Вариант 6.3.* В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, восемь учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	4 января	6
Захар	5 декабря	7
Игорь	2 июля	8

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

Ответ:  $C_7^2 = 21$

*Вариант 6.4.* В классе стоит 31 пустой стул. Стулья расставлены по кругу и пронумерованы по порядку по часовой стрелке числами от 1 до 31. Ученики входят в класс по одному и занимают места по следующим правилам:

1. Когда ученик входит в класс, он садится на стул, номер которого соответствует числу месяца, в который он родился, если только этот стул ещё не занят.
2. Если этот стул уже занят, ученик начинает движение от этого стула по часовой стрелке и садится на первый попавшийся свободный стул.

Предположим, девять учеников вошли в класс и заняли места как показано в таблице:

Ученик	День рождения	Номер стула
Андрей	1 мая	1
Богдан	1 февраля	2
Вадим	3 сентября	3
Глеб	3 августа	4
Дмитрий	4 апреля	5
Евгений	4 января	6
Захар	5 декабря	7
Игорь	5 октября	8
Кирилл	2 июля	9

Сколько существует различных вариантов того, в каком порядке они могли заходить в класс?

Ответ:  $C_8^2 = 28$

**Задача 7.1.** Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P$ ,  $Q$ ,  $X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 2$ ,  $QC = 5$ ,  $AX = 1$ .




Рис. 14: К задаче 7.1

Ответ: 4

*Решение.* Заметим, что четырёхугольник  $PQYX$  является равнобокой трапецией, поскольку он вписан в окружность и  $PQ \parallel XY$ . Отметим точку  $S$  — середину  $PQ$  и точку  $T$  — середину  $XY$ . Из-за равнобокости трапеции  $PQYX$  прямая  $ST$  является срединным перпендикуляром к отрезкам  $PQ$  и  $XY$ . Тогда четырёхугольники  $ABST$  и  $TSCD$  являются прямоугольниками.

Тогда  $BS = AT$  и  $SC = TD$ .

$$BS + TD = AT + SC$$

$$BP + PS + TY + YD = AX + XT + SQ + QC$$

$$BP + YD = AX + QC$$




Рис. 15: К решению задачи 7.1

Откуда следует, что  $DY = AX + QC - BP = 5 + 1 - 2 = 4$ .

□

*Вариант 7.2.* Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P, Q, X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 3, QC = 7, AX = 2$ .




Рис. 16: К задаче 7.2

*Ответ:* 6

*Вариант 7.3.* Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P, Q, X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 4, QC = 7, AX = 2$ .

*Ответ:* 5

*Вариант 7.4.* Окружность пересекает стороны  $BC$  и  $AD$  прямоугольника  $ABCD$  в точках  $P, Q, X$  и  $Y$  так, как показано на рисунке. Найдите длину отрезка  $DY$ , если известно, что  $BP = 5, QC = 9, AX = 2$ .




Рис. 17: К задаче 7.3




Рис. 18: К задаче 7.4

Ответ: 6

**Задача 8.1.** Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 600000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

Ответ: 357576

*Решение.* Заметим, что  $a_1 = 1$ . Пусть для некоторого  $n > 1$  выполнено  $a_n = 1$ , тогда  $\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,0 \dots 01 \dots$ . Предположим, что 1 стоит на  $k$ -ом месте. Тогда выполнено неравенство

$$\frac{1}{10^k} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{2}{10^k}$$

Возведём неравенство в квадрат (используя, что все числа положительные)

$$\frac{1}{10^{2k}} \leq \frac{1}{n} < \frac{4}{10^{2k}}$$

$$\frac{10^{2k}}{4} < n \leq 10^{2k}$$

Получается, что если  $n > 1$ , то должно находиться в одном из следующих полуинтервалов:

$$(25, 100] \quad (2500, 10000] \quad (250000, 1000000] \quad (25000000, 100000000] \quad \dots$$

Среди чисел  $n$  от 1 до 600000 подходящих нам будет ровно

$$1 + (100 - 25) + (10000 - 2500) + (600000 - 250000) = 1 + 75 + 7500 + 350000 = 357576$$

□

*Вариант 8.2.* Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 700000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

*Ответ:* 457576

*Вариант 8.3.* Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 800000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

*Ответ:* 557576

*Вариант 8.4.* Последовательность натуральных чисел  $\{a_n\}$  такова, что  $a_n$  равен первой ненулевой цифре десятичной записи числа  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ . Сколько среди первых 900000 членов этой последовательности таких, которые равны 1?

*Ответ:* 657576